



ФГБУ «НМИЦ ФПИ»

— основан в 1918 году —

Федеральное государственное бюджетное учреждение «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ВЕРСИЯ НА 30.05.2020 г.

ТАКТИКА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ) У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

I. Контактный

Описание

- Был контакт с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19.
- Симптомы ОРВИ отсутствуют.

Тактика ведения

- оформление листка нетрудоспособности на 14 дней;
 - изоляция на дому на 14 дней;
 - в случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает врача на дом;
- Забор мазка из носо- и ротоглотки: в день обращения с первичным осмотром врача (в кратчайшие сроки), при появлении клинических симптомов ОРВИ – немедленно.

II. ОРВИ легкого течения (за исключением ОРВИ легкого течения у пациента из группы риска)

Описание

Наличие 2-х критериев:

- SpO₂ ≥ 95% (обязательный критерий);
- T < 38 °C;
- ЧДД ≤ 22.



Тактика ведения

- забор мазка из носо- и ротоглотки в день обращения с первичным осмотром врача;
 - оформление листка нетрудоспособности на 14 дней;
 - изоляция на дому на 14 дней;
 - ежедневный аудиоконтроль состояния, повторное посещение врача в случае ухудшения состояния пациента;
 - забор контрольного мазка из носо- и ротоглотки (с 10 по 14 день дважды – в подтвержденном случае COVID-19);
- Выписка в соответствии с порядком выписки (перевода) из медицинской организации и критериями выздоровления пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

III. ОРВИ легкого течения у пациента, относящегося к группе риска (лица старше 65 лет, лица с наличием хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, системными заболеваниями соединительной ткани, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитами, циррозом печени, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника)

Описание

Наличие 2-х критериев:

- SpO₂ ≥ 95% (обязательный критерий);
- T < 38 °C;
- ЧДД ≤ 22.

Тактика ведения

Госпитализация специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи.



IV. "Неконтактный" пациент (НЕ входит в группу I, II, III)

Описание

Наличие 2-х критериев:

- SpO₂ < 95% (обязательный критерий);
- T ≥ 38 °C;
- ЧДД > 22.

Тактика ведения

Госпитализация специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи.