



ФГБУ «НМИЦ ФПИ»

— основан в 1918 году —

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ВЕРСИЯ НА 30.05.2020 г.

ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Средней тяжести

- находящиеся на амбулаторном лечении;
- при сохранении температуры тела $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ в течение 3 дней

Или

исходя из наличия двух из следующих критериев:
- $\text{SpO}_2 \geq 95\%$ (обязательный критерий);
- $T < 38^{\circ}\text{C}$;
- $\text{ЧДД} \leq 22$.

Тяжелое состояние, не требующее искусственной вентиляции легких


- $\text{SpO}_2 < 95\%$;
- $T \geq 38^{\circ}\text{C}$;
- $\text{ЧДД} > 22$;
- наличие признаков пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов компьютерной томографии легких).

Тяжелое состояние, требующее проведения неинвазивной вентиляции легких

наличия двух из следующих критериев:
- $\text{SpO}_2 \leq 93\%$;
- $T \geq 39^{\circ}\text{C}$;
- $\text{ЧДД} \geq 30$;
Дополнительные признаки:
- снижение уровня сознания,
- ажитация,
- нестабильные гемодинамические показатели (систолическое артериальное давление < 90 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление < 60 мм рт. ст.).

Крайне тяжелое состояние, требующее проведения инвазивной искусственной вентиляции легких

- нарушение сознания;
- $\text{SpO}_2 < 92\%$ (на фоне кислородотерапии);
- $\text{ЧДД} > 35$.



Вне зависимости от тяжести заболевания:

а) пациенты, относящиеся к группе риска (возраст старше 65 лет, наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени, длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию);

б) пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.